

103年高關懷藥事照護案例報告

新北市喜悅藥局 蔡雅惠

103.10.16

病患基本資料

- 周先生,52歲
- 身高176.5cm,體重70kg,BMI22.5kg/m²
- 油行老闆,貨品自送,與太太、兒子同住,飲食:早,午餐外食;晚餐大部分由太太張羅,以米飯為主食
- 有抽菸[平均一天一包],喝茶[自泡高山茶,一天1-2泡]習慣
- 視力正常,聽力正常,藥品可整粒吞服
- 每週爬山1-2次,每次2-3hrs

病患基本資料

- 過去病史：
高血壓,心臟血管繞道,糖尿病,頸椎椎間盤突出
- 現在病史：
高血壓,糖尿病,高脂血症

病患用藥

處方日期	商品名	成分_單位	用量 用法	實際用量用法
103.06 新光心內 蔡適吉	Blopress plus	Candesartan16mg/ Hydrochlorothiazide 12.5mg	0.5# qd	0.5#qd 7:00[1w5d]
	Dilatrend	Carvedilol_6.25	1# qd	1# qd 7:00[1w5d]
	Bokey	Aspirin_100mg	1# qd	1# qd 7:00[1w5d]
	Amaryl-M	Glimepiride2mg/ Metformin_500mg	1# bid	1# bid 7:00,17:00
	Galvus	Vildagliptin_50mg	1# qd	1# prn[很少服 藥]
	Vytorin	Simvastatin10mg/ Ezetimibe_20mg	1# hs	1# hs[很少服 藥]

病患用藥

處方日期	商品名	成分_單位	用量 用法	實際用量用法
103.09 新光心內 蔡適吉	Diovan	Valsartan_160mg	0.5#qd	0.5# qd 7:00
	Bokey	Aspirin_100mg	1# qd	1# qd 7:00
	Amaryl-M	Glimepiride2mg/ metformin_500mg	1# bid	1# bid 7:00,17:00
	Galvus	Vildagliptin_50mg	1# qd	1# hs 22:00
	Vytorin	Simvastatin10mg/ Ezetimibe_20mg	1# hs	1# hs 22:00

醫療問題一

- 糖尿病

目前用藥:

amaryl-m 1# bid

galvus 1# hs

HbA1c 8.3[103.06];HbA1c 6.9[103.09]

晨間空腹血糖平均約120mg/dl;

下班回到家時[約17:00]常會有低血糖現象[心悸, 手抖,眩暈],請病人測血糖值,平均在80-90mg/dl 上下,請問是否有好的處理方式?

醫療問題二

- 高血壓

目前用藥:

Diovan_160mg 0.5# QAM

Bokey_100mg 1# QAM

過去用藥:

Blopress plus 16/12.5mg 0.5# QAM

Dilatrend_6.25mg 1# QAM

Bokey_100mg 1# QAM

病患反應血壓藥吃與不吃血壓值相差不大
告知血壓藥有保護腎臟作用,且心臟開過刀,又有
三高,所以更應嚴格注意維持在130/90 mmHg之
內

醫療問題三

- 高血脂

目前用藥:

Vytorin_10/20mg QHS

病患教育:

提醒降血脂藥要遵從醫師指示按時服用