



## 社區藥局用藥照護個案報告

第 21 組 翰生藥局

邱 垂 珍 藥師



### 個案基本資料

- 姓名：陳 x x
- 性別：男
- 年齡：68歲
- 身高：165cm
- 體重：72kg
- BMI：26.5
- 家庭狀況：與未婚小兒子同住
- 經濟狀況：OK



## History

---

- 糖尿病
- 高血壓
- 高尿酸
- 高血脂
- B.P.H



## 危險因子評估

---

- 家族史
- 三餐外食
- 體重過重
- 抽煙
- 飲酒過量
- 缺少運動

## 藥品使用記錄 -1 (97/07/28以前)

| 藥名              | 劑量                                   | 用法     |
|-----------------|--------------------------------------|--------|
| Glucomet 5/500  | Glyburide 5mg+<br>Metfomin 500mg     | 2#Bid  |
| Avendamet 2/500 | Rosiglitazone 2mg+<br>Metfomin 500mg | 1#Qd   |
| Atenolol        | 100mg                                | 1#Qd   |
| Adalat OROS     | Nifedipine 30mg                      | 1#Qd   |
| Enalapril       | 20mg                                 | 1#Qd   |
| Terazosin       | 2mg                                  | 1#Hs   |
| Eye neostigmine |                                      | o.uBid |

## 個案血壓狀況

| 日期       | 血壓(BP)     | 脈搏(HR) |
|----------|------------|--------|
| 97/0131  | 153/83mmHg | 68     |
| 97/03/29 | 145/81mmHg | 66     |
| 97/04/02 | 126/74mmHg | 63     |
| 97/0423  | 162/79mmHg | 66     |
| 97/05/30 | 130/78mmHg | 66     |
| 97/07/28 | 137/79mmHg | 68     |



## 生化檢驗數值

| 日期       | Glucose-AC      | HbA1c           | Sr. Creatinine |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 97/01/31 | 165             | 6.9             | 1.4            |
| 97/04/23 | 216             | 7.5             | 1.4            |
| 97/07/28 | 97              | 6.8             | 1.3            |
| 97/10/06 | 321             | 9.7             | 1.7            |
| 97/07/28 | Triglycrine:308 | Cholesterol:216 | HDL-Chol:30    |



## 藥師介入原因

### 病人告知血壓到傍晚即升高

- 原因：Y伯因年輕時食道因化學物品灼傷 以致食道狹窄，故藥品必須嚼碎嚼細方能吞嚥。
- 建議：藥物更換及增加降血脂藥物。

## 藥品使用記錄 -2 (97/07/28以後)

| 藥名              | 劑量                               | 用法     |
|-----------------|----------------------------------|--------|
| Glucomet 5/500  | Glyburide 5mg+Metfomin<br>500mg  | 2#Bid  |
| Pioglitazone    | 30mg                             | 1#Qd   |
| Atenolol        | 100mg                            | 1#Qd   |
| Amtrel          | Amlodipine5mg+Benazepril<br>10mg | 1#Qd   |
| Simvastatin     | 20mg                             | 1#Hs   |
| Terazosin       | 2mg                              | 1#Bid  |
| Indapamide      | 2.5mg                            | 1#Qd   |
| Eye neostigmine |                                  | o.uBid |

## 藥師介入後血壓狀況

| 日期       | 血壓(BP)     | 脈博(HR) |
|----------|------------|--------|
| 97/08/14 | 126/77mmHg | 70     |
| 98/03/04 | 134/70mmHg | 77     |
| 98/06/23 | 138/78mmHg | 72     |
| 98/12/14 | 136/75mmHg | 66     |
| 99/04/12 | 114/64mmHg | 64     |
| 99/06/04 | 110/61mmHg | 60     |



## 生化檢驗數值

| 日期       | Glucose-AC | HbA1c | Sr.Creatinine |
|----------|------------|-------|---------------|
| 97/10/06 | 321        | 9.7   | 1.7           |
| 98/01/09 | 182        | 8.2   | 1.8           |
| 98/04/20 | 286        | 9.6   | 2.4           |
| 98/07/16 | 165        | 7.9   | 3.6           |
| 98/10/12 | 293        | 11.1  | 3.7           |
| 99/01/11 | 165        | 7.8   | x             |
| 99/04/06 | 214        | 10.4  | 2.7           |
| 99/06/25 | 246        | 11.4  | 3.2           |



## 生化檢驗數值

| 日期       | Cholesterol total | Triglyceride | HDL- Cholesterol |
|----------|-------------------|--------------|------------------|
| 97/10/06 | 152               | 202          | 28               |
| 98/01/09 | 117               | 158          | 50               |
| 98/04/20 | 104               | 113          | 45               |
| 98/07/16 | 160               | 181          | X                |
| 98/10/12 | 181               | 410          | 37               |
| 99/01/11 | 145               | 250          | 33               |
| 99/04/06 | 172               | 159          | 36               |
| 99/06/25 | 218               | 497          | 32               |



## 急性期糖尿病

| 日期       | Glucose-AC | Bp         | HR |
|----------|------------|------------|----|
| 99/07/27 | 484        | 89/50mmHg  | 62 |
| 99/07/28 | 113        | 95/62mmHg  | 73 |
| 99/07/29 | 204        | 100/54mmHg | 58 |
| 99/07/30 | 199        | 133/73mmHg | 60 |
| 99/08/05 | 255        | 96/58mmHg  | 65 |



## 急性期糖尿病可能原因

- 原因：Y伯因牙齒不好，咀嚼功能差以致吃東西無法完全嚼碎，故藥品較硬製劑無法嚼碎便吞不下去就吐掉，產生藥品劑量不夠。又因夏天碳水化合物飲用過量。
- 建議：1.看牙醫  
2.藥物劑型改變,使用易嚼碎之劑型。  
3.使用研鉢。
- **Probable Mechanism :**  
There are reports of hypoglycaemia associated with the use of ACE inhibitors and antidiabetic drugs. Patients on antidiabetic drugs who are just starting starting ACE inhibitor therapy should be advised to monitor themselves for any signs of hypoglycaemia. There are also reports of increased incidence of pancytopenia (an adverse effect of sulfonylureas), especially in patients with renal impairment (MIMS)



## 衛教項目

---

- 控制體重
- 戒煙
- 戒酒
- 控制高血壓
- 控制糖尿病
- 規則服藥
- 運動



謝 謝 聆 聽