

社區藥局用藥照護

柯受祿藥師 郭添裕藥師
簡麗娥藥師 江本平藥師
張岡鴻藥師 呂秋東藥師

簡報人：江本平
99年10月01日



個案基本資料

- 姓名: 李xx
- 性別: 男
- 出生: 19年11月10日
- 體型:



個案健康狀況



- 疾病史：
糖尿病、高血壓、痛風、冠狀動脈心臟病、慢性阻塞性肺疾病、高血 酯症、肌腱炎。

用藥紀錄



序 號	藥 品 名 稱	含 量	劑 量 / 用 法
1	Aspirin	100 MG	1# / QD
2	Tradate	200 MG	1# / BID
3	exforge	5/80MG	1# / QD
4	napamide	2.5 MG	1# / QD
5	Amaryl	2 MG	1# / BID
6	glucobay(acarbose)	50 MG	1# / TID
7	Allopurinol	100 MG	1# / QD
8	Persantin	25 MG	1# / TID
9	Strocain	10 MG	1# / BID
10	Mucosolvan	30 MG	1# / BID

藥品交互作用



- **AMARYL 2.0 TABLETS <==> NAPAMIDE F.C TABLETS**

許多臨床研究發現，**thiazid**類利尿劑降低組織對胰島素之敏感性、減少胰島素之分泌、增加鉀離子排洩，因而影響**sulfonylureas**之降血糖作用，導致高血糖症。此交互作用發生於併用後之數日至數月內，嚴重者發生高血糖高滲透壓非酮體性昏迷。併用時嚴密監測病患血糖值，若血糖過高時，增加**sulfonylureas**降血糖要之劑量。

個案基本資料



- 姓名: 楊**XX**
- 性別: 男
- 出生: **19年09月15日**
- 體型:

個案健康狀況



- 疾病史：

糖尿病、塵肺症、高血壓、
消化性潰瘍、高血酯症。

用藥紀錄



序號	藥品名稱	含量	劑量/用法
1	Norvasc	5 MG	1#/ QD
2	Novonorm	1 MG	2#/TID
3	Glucophage	500 MG	1#/BID
4	Avandia	4 MG	1#/ QD
5	Strocain	10 MG	1#/BID
6	Ramitace	2.5 MG	1#/ QD
7	Phyllocontin	225 MG	1#/BID
8	Lopid	300 MG	1#/BID

藥品交互作用



- **GEMFIBROZIL <==> REPAGLINIDE**

gemfibrozil、itraconazole和他們的組合的作用對 repaglinide藥物代謝動力學和藥效學：
gemfibrozil和repaglinide之間的潛在危險的相互作用。

個案基本資料



- 姓名: 游XX
- 性別: 女
- 出生: 48年07月08日
- 體型:

個案健康狀況



● 疾病史:

糖尿病、高血壓、慢性肝炎、甲狀腺疾患、糖尿病神經病變、高血酯症、周邊血管疾病、白內障。

用藥紀錄



藥品名稱	含量	劑量/用法
Amaryl	2 MG	1#/ QD
Dilatrend	25 MG	1#/ QD
Glucophage	500MG	2#/BID
Strocaïn	10 MG	1#/ QD
Aspirin	100MG	1#/ QD
Methylcoba	500MG	1#/ QD
NPH(Humulin N)	1 KIU	1#/PRN
Syringelcc(insulin)		1#/QD
coumadin	5 MG	0.25#/QD
crestor	10 MG	0.5#/HS

藥品交互作用



- **WARFARIN SODIUM <==> ROSUVASTATIN
CALCIUM**

HMG-CoA reductase inhibitors可能會抑制warfarin的肝臟代謝，使得warfarin抗凝血的作用增加，所以在開始或停止併用**HMG-CoA reductase inhibitors**時，應監測抗凝血藥物之參數。不過這些藥物中之**atorvastatin**，**pravastatin**並不會和warfarin有交互作用。

感謝聆聽

