

居家藥事照護個案報告

存明藥局 劉明勝藥師

個案基本資料

- 姓名：徐先生
- 年齡：78 歲
- 身高：158 cm
- 體重：75 kg
- **BMI**：30.1 (肥胖)
- 行動能力：在家行動正常,出外電動四輪車,活動量少

個案基本資料

- 生活背景

與兒媳同住. 白天兒媳上班, 夫妻倆互相照顧

- 診斷

4389 腦血管疾病 4019 高血壓
2500 糖尿病 2724 高脂血症

- 藥物過敏 -- 沒有

用藥記錄

- 心臟內科

1. Bokey 100mg	1# QDAM
2. Avandamet 2/500mg	0.5# BID
3. Mg O 250mg	1# TID
4. Caduet 5/10mg	1# QDAM
5. Aprovel 150mg	1# QDAM

- 泌尿科

Dampurine 25mg	1# TID
----------------	--------

用藥記錄

- 基層診所
 1. Norvasc 5mg 1# QD
 2. Tenormin 100mg 1# QD

Bokey與Tenormin交互作用

- Significance 危害等級：2
- Onset 作用速度：Rapid
- Severity 嚴重程度：Moderate
- Document 文獻記載：Suspected

重複成分用藥

- Caduet 5/10mg
 - Amlodipine besylate 5mg
 - Atorvastatin calcium 10mg
- Norvasc 5mg
 - Amlodipine besylate 5mg

實際用藥

- 心臟內科和泌尿科都照醫囑服用
- 基層診所
 - Tenormin 100mg 1# QD
 - 未用 (轉診前在基層診所之用藥,醫生照之前病歷開)
 - Norvasc 5mg 1# QD
 - 1# PRN (醫院之前用藥,病人知其為高血壓用藥,要求基層診所醫生開處方,下午不舒服量血壓高時,收縮壓>140mmHg,自行吃1顆)

月/日	收縮壓/舒張壓 (毫米汞柱)	脈搏 (次/分)	備註 (血糖/血脂...等)	月/日	收縮壓/舒張壓 (毫米汞柱)	脈搏 (次/分)	備註 (血糖/血脂...等)
8/10	150	72	95	9/15	150	71	72
8/16	134	66	88	9/19	163	79	76
8/19	133	63	89	9/24	156	77	65
8/24	147	64	62	9/30	157	73	73
8/26	145	61	67	10/1	134	65	65
9/4	176	80	74	10/2	166	80	
9/7	138	76	89				
9/14	155	75	65				

個案衛教

- 幫他做個人用藥記錄手冊
 - 教導其看任何醫生時出示手冊
 - 避免重複用藥,交互作用等等現象發生
- 確認個案了解每種藥物之作用與用法
- 教導正確量血壓做記錄
 - 測量前安靜休息5到15分鐘,座位舒適,使心臟、上臂、血壓計在同一水平面
 - 每日量兩次血壓,回診時給醫生參考,併說明本身狀況

個案衛教

- 飲食控制 (三高)
 - 限制熱量,低鹽,低油脂
- 運動量少,建議多運動
- 減重

rosiglitazone maleate(Avandia)

- 衛生署食品藥物管理局加強藥品說明書之警語內容並限縮其使用時機及對象(99/7/15)
 - (1) **Avandia** 不可作為糖尿病患者之第一線治療之選擇，只有當病人對其他降血糖藥品單獨治療或合併治療均無法良好控制時，才可選擇使用本藥品。
 - (2) 不建議使用於缺血性心臟病之病人。
 - (3) 不建議使用於心臟衰竭症狀之病人。
 - (4) 心臟衰竭狀態第3級或第4級（紐約心臟協會『NYHA』Class III 或IV cardiacstatus）的病人禁止使用本藥品。
- 心臟衰竭的徵兆或症狀
 - 過度、快速的體重增加，呼吸急促困難，及水腫等等