

99年度社區藥局 用藥照護諮詢站居家個案研討



大家好!

報告藥師: 彭麗靜

2010.11.19

1

個案基本資料

- 姓名: 李○○先生
- 年齡: 66y
- 教育程度: 大專
- 主要照顧者: 配偶 (64y)同住
- 身高: 178cm, 體重: 65kg, BMI: 20.52
- 使用輔具: 臥床與輪椅 (重度肢體障礙)

2

藥師6月30日第一次訪視,
由元配照顧,鼻胃管進食,心智功能完好



疾病史

- 91年開始中風,高血壓,糖尿病,癲癇,前列腺肥大症,失眠.
- 造成失能原因: 疾病與退化
- 藥物過敏紀錄: 無
- 看病醫院: 新店耕莘醫院
- (胸腔內科與神經內科)2位醫師處方箋

6/29~9/29 胸腔內科慢性處方

商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法
1. PROMETIN	METOCLOPRAMIDE	5mg /tab	1#/TID
2. Kascoal	DIMETHICONE	40mg /tab	1#/TID
3. Medicon-A	Potassium Cresol Sulfonate 90mg	每膠囊含	1#/TID
	Dextromethorphan HBr 20mg		
	Lysozyme 20mg		
4. Glibudon	METFORMIN HCL	500mg/tab	1#/QD
5. Diabitin	GLYBURIDE	5mg/tab	1#/BID
6. Persantin	DIPYRIDAMOLE	75mg /tab	1#/BID
7. Tenolol	ATENOLOL	100mg/tab	0.5#/QD
8. Diltisser	Diltiazem	30mg/tab	1#/TID
9. Harnalidge	TAMSULOSINE	0.2mg/ tab	1#/QD
10. Eurodin	ESTAZOLAM	2mg/ tab	1#/HS ⁵

6/29~9/29 神經內科慢性處方

商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法
11 RIVOTRIL	CLONAZEPAM	0.5mg/tab	0.5#/TID
12 DILANTIN	PHENYTOIN	100mg/cap	1#/TID
13 Methycobal	MECOBALAMINE	500mcg/cap	1#/BID
14 TOFRANIL	IMIPRAMINE HCL	25mg/tab	1#/HS

6

用藥建議 (6/30第一次訪視)

1. **Harnalidge D[®] [TAMSULOSINE]**,
0.2mg/tab, 1#/QD, 為持續釋放手溶錠, 請勿磨粉管灌, 或先溶於水再管灌.
2. **Medicon-A** 如病人沒有咳嗽與痰液, 希望能停藥之建議.
3. 建議每天的血壓與心跳, 需測量記錄提供醫師參考, 與抽血的檢驗單能提供藥師參考.

7

9/30~12/30 胸腔內科慢性處方如下 (原神經內科處方不變)

商品名	學名	含量/劑型	劑量/用法
1. PROMETIN	METOCLOPRAMIDE	5mg /tab	1#/TID
2. Kascoal	DIMETHICONE	40mg /tab	1#/TID
3. Medicon-A	Potassium Cresol Sulfonate 90mg	每膠囊含	1#/TID
	Dextromethorphan HBr 20mg		
	Lysozyme 20mg		
4. Glibudon	METFORMIN HCL	500mg/tab	1#/TID
5. Diabitin	GLYBURIDE	5mg/tab	1#/BID
6. Persantin	DIPYRIDAMOLE	75mg /tab	1#/BID
7. Tenolol	ATENOLOL	100mg/tab	0.5#/QD
8. Diltisser (Delete)	Diltiazem	30mg/tab	1#/TID
9. Harnalidge	TAMSULOSINE	0.2mg/ tab	1#/QD
10. Eurodin	ESTAZOLAM	2mg/ tab	1#/HS ⁸

用藥建議 (10/20第二次訪視)-1

- 因請家屬留意血糖的監測(飯前約平均126mg/dL)給醫師參考,第一次6/30的處方箋 Glibudon® (METFORMIN HCL) 500mg, 原為QD,現改為TID.
- 因請家屬每天的血壓與心跳量測給醫師參考,月平均收縮壓126mm/Hg,舒張壓73mm/Hg,脈搏79次/分,已趨正常,所以醫師刪除 Diltisser® (DILTIAZEM).

9

用藥建議 (10/20第二次訪視)-2

- 參考資料FROM : MICROMEDEX® 1.0 (Healthcare Series)
- Drug-Drug Interaction (Result) : Contraindicated
 - Summary:
 - IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -----METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE of Interaction
 - Concurrent use of METOCLOPRAMIDE and TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS may result in an increased risk of extrapyramidal reactions or neuroleptic malignant syndrome. (NMS)是一種服用精神藥物引起罕見但可能致命性的藥物不良反應如發燒 (>38°C), 肌肉僵硬, 意識改變, 自主神經系統異常等症候群症狀
 - 建議可否Delete[Metoclopramide]或請更換Bromopride 10mg 因
 - 1.本品對中樞神經系統無影響(一般之Metoclopramide 通常可影響 CNS)。
 - 2.安全性高, 毒性低。
 - 3.作用迅速, 療效優異。

10

用藥建議 (10/20第二次訪視)-3

- 參考資料：國家網路藥典
- RIVOTRIL® (CLONAZEPAM), 0.5mg/TID, 一天3次, 因其副作用會想睡, 噁心嘔吐, 精神恍惚, 建議如病況好轉請逐漸降低劑量, 但不可立刻停藥.

11

用藥建議 (10/20第二次訪視)-4

- 參考資料FROM : MICROMEDEX® 1.0 (Healthcare Series)
- 請監測DILANTIN® (PHENYTOIN)血中濃度, 其 TI治療指數最好為10-20, 怕其副作用產生. phenytoin toxicity (ataxia, hyperreflexia, nystagmus, tremors). 另DILANTIN 易阻塞餵食管末端, 造成藥品吸收不完全, 所以需常清洗餵食管.

12

Summary

- 1. 照管中心給的處方用藥資料不齊全,因看不到個案的處方箋,所以第一次訪視給予簡單的建議.
- 2. 第二次訪視給個案家屬與醫師建議表較齊全了.(因有MICROMEDEX與國家網路藥典為佐證)
- 3. 但可惜,照管中心不給第3次訪視,所以也無法知道我給醫師的建議單,是否接受?

13

請給予建議與指教Thanks.

Q & A

14